

تومور بورد Locally Advanced Breast Cancer

زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۵/۰۹/۲۴

محل برگزاری: قم - خیابان ۱۹ دی (باچک)، کوچه ۱۰، ساختمان فرجاد، سالن کنفرانس فرجاد
مخاطبان: متخصصین انکولوژی، رادیولوژی، جراحی عمومی، زنان، رزیدنت جراحی

جلسه بعد از معرفی بیمار توسط سرکار "خانم دکتر مهدوی"، سعی شد تا نکات حائز اهمیت آن مورد نظر بررسی شود و نقطه نظرات پزشکان متخصص مدعو مطرح گردد.

طبق برنامه آموزشی گروه فرجاد، این جلسه به عنوان پنجمین تومور بورد از سری جلسات گروه تشخیصی درمانی فرجاد با گرداندگی "دکتر کریم‌خانی" شکل گرفت. در این



ب - انتخاب بیماران برای نئوادجونت کموتراپی

۱. در بیماران لوکالی ادونس برست کنسر (بیماران $cT3N_0$ (IIB) و بیماران مرحله‌ی III) انتخاب می‌شود
۲. کیس‌های انتخابی early stage برست کنسر: stage 1,2 که به خاطر نسبت تومور به پستان امکان BCS ندارند یا به علت محل تومور نتیجه‌ی cosmetic بعد از عمل خوبی ندارند. در بیماران تریپل نگاتیو و HER-2 مثبت ممکن است حتی در تومورهای کوچک مثل T1c کموتراپی نئوادجونت توصیه گردد.
۳. بیمارانی که کنتراندیکاسیون موقت جراحی دارند، به طور

در این جلسه سوالات زیر مطرح و پاسخ آنها به هم‌اندیشی گذاشته شد:

- الف - تاثیر کموتراپی نئوادجونت در بیماران کنسر پستان مهاجم بدون متاستاز
۱. کاهش ریسک عود دوردست در گروهی از بیماران با ریسک بالا برای متاستاز
 ۲. Down Stage کردن تومور که می‌تواند باعث کاهش وسعت جراحی، بهبود Cosmetic و در نتیجه کاهش عوارض بعد از عمل همانند لنفادم گردد.
 ۳. بررسی اولیه پاسخ تومور به درمان سیستمیک

سمت Chest wall با MRI در صورت نیاز قابل بررسی می‌باشد.

هـ- کموتراپی نئوآدجونت در بیمار با تشخیص کنسر التهابی پستان (Inflammatory breast cancer) مرگ و میر بیماران را کاهش می‌دهد و قطعاً انتخاب ارجح است.

در این جلسه از حضور اساتید محترم، سرکار خانم دکتر شمس کلاهی، خانم دکتر مشایخی، خانم دکتر زاهدی، خانم دکتر مهدوی، جناب آقای دکتر سبحانی، آقای دکتر سید ابوالقاسم اسحق حسینی، آقای دکتر تقوی، آقای دکتر مرتضوی، آقای دکتر دمشقی، آقای دکتر موسوی مفتخرزاده، آقای دکتر سید جواد موسوی، آقای دکتر علیزاده و آقای دکتر کریم‌خانی، بهره‌مند گشتیم.

مثال در زمان خاصی از بارداری بوده یا کنتراندیکاسیون مدیکال دارند.

ج- انجام SLB در بیمارانی که نئوآدجونت کموتراپی اندیکاسیون دارند؛ در صورتی که بیمار کاندید SLB قبل از انجام نئوآدجونت کموتراپی می‌باشد بعضی از مراکز برای اینکه بیمار فقط یک نوبت بیهوشی بگیرد SLB را به بعد از نئوآدجونت تراپی موکول می‌کنند.

د- اهمیت Imaging در کلینیکال Staging قبل از نئوآدجونت کموتراپی

۱. در ارزیابی اندیکاسیون SLB (تعیین عدم وجود لنف نود کلینیکی به وسیله‌ی معاینه و سونوگرافی تواما گذاشته می‌شود).
۲. لنف نودهای اینترنال ماموری و گسترش عمقی تومور به

